

DEZINFEKČNÍ ŘÁD sociální služby Jihomoravského kraje,příspěvkové organizace

CO?		KDY?	JAK?	ČÍM?	AKTIVNÍ LÁTKA	KOLIK?			EXPOZICE	SPEKTRUM ÚČINNOSTI
						KONCENTRACE	ředění na 1l pracovního roztoku	ředění na 10l pracovního roztoku		
DEZINFEKCE RUKOU	péče o ruce	vždy po příchodu do práce, vždy po použití WC, vždy po mechanickém znečištění,jako součást barierového režimu, po sundání rukavic dle potřeby	na rukách rozetřít trochu vody, opláchnout, osušit ručníkem na jedno použití	SILONDA	kosmetická směs				x	x
	hygienické mytí rukou (HMR); dekolonizace MRSA pozitivních			SILONDA CARE	kosmetická směs			x	x	
				MANISOFT	chlórhexidin/KAS			30s	A(B)(V)	
	hygienická(HDR) a chirurgická(CHDR) dezinfekce rukou	při jakémkoliv kontaktu s biologickým materiálem, po manipulaci sprádlem nebo s pacientem s podezřením na infekční onemocnění, jako součást barierového režimu, před ošetřovatelskými úkony	nanést na suchou pokožku, zbavenou mechanických nečistot a vtírat cca po dobu 1 až 1,5 min.	SKINSAN SCRUB N	chlórhexidin,KAS	HMR 3 ml/30 s dekolonizace MRSA 60 s				A(B)(V)
				PHAGO'RUB GEL SPS	etanol	HDR 3 ml/30 s, CHDR 5 ml/2x45 s				ABTMV
				MANUSEPT BASIC	etanol	HDR 3 ml/30 s CHDR 5 ml/2x90 s				A(B)(V) +rotavirus
				STERILLIUM CLASSIC PURE	propanoly	HDR 3 ml/30 s CHDR 5 ml/90 s				A(B)(V) +rotavirus
			STERILLIUM	propanoly	HDR 3 ml/30 s CHDR 5 ml/90 s				A(B)(V) +rotavirus	
			STERILLIUM MED	etanol	HDR 3 ml/30 s, CHDR 5 ml/90 s				ABTMV	
DEZINFEKCE KŮŽE, SLIZNIC	před vpichy	na kůži s nízkým obsahem mazových žláz před injekcí, punkcí, odběrem krve, očkováním	oblast smotčit postříkem nebo pomocí tampónu	SKINSEPT F	alkohol	neředěný			15 s	A(B)(V)
		na kůži s nízkým obsahem mazových žláz před punkcí kloubů, tělních dutin, dutých orgánů					1min			
DEZINFEKCE a ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ	vyšší stupeň a druhý stupeň dezinfekce	po použití, při kontaminaci,osobní předměty klientů dle potřeby, nebo dle provozního řádu	zcela ponořit do připraveného roztoku, exponovat, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat nebo ponořit do vyššího stupně dezinfekce	CHIROSAN PLUS	kyselina peroxycetová	2%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	10min	ABCTMV
	dekontaminace nástrojů			CHIROSAN PLUS	kyselina peroxycetová	0,5%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	15min	AB(V)
	dekontaminace nástrojů			DISCLEEN EXTRA	KAS,amin	1%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	15min	A(B)(V)
DEZINFEKCE MALÝCH PLOCH	vyšetřovací a zákrovové stoly, vozíky, instrument. stoly, lehátka, přístroje	1 x denně, dle potřeby	důkladně omýt pracovním roztokem, exponovat, vytřít do sucha	BACILLOL AF	alkohol	koncentrát			1min	A(B)(V) +rotavirus
			vlhkým ubrouskem důkladně otřít dezinfikovanou plochu	BACILLOL 30 SENSITIVE FOAM	amin	koncentrát			1min	A(B)(V) +rotavirus
				INCIDIN ALCOHOL WIPE	alkohol	ubrousek			1min	A(B)(V) +rotavirus
				MIKROZID SENSITIVE WIPES	KAS				1min	A(B)(V) +rotavirus
DEZINFEKCE PLOCH A POVRCHŮ	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, předměty	1x denně, dle potřeby	mytí s dez. účinkem (kumulativní efekt) pracovním roztokem otřít plochy, povrchy do mokra a nechat zaschnout, 1x měsíčně prostředek za jiný s odlišnou aktivní látkou	INCIDIN ACTIVE	kyselina peroctová	2%			30 min	ABCTM(V)
		1 x denně, dle potřeby	na odmyváni vrstev dezinfekčního přípravku, použít vždy před střídáním účinné látky/přípravku	MAXX MAGIC	detergent	0,50%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	x	x
		1x denně, dle potřeby	systém suchých utěrek INCIDIN WIPES; naplnit dávkovací zásobník roztokem o požadované aplikační koncentraci 2,3 až 2,5 litru roztoku	INCIDIN PRO	KAS	1%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	15 min	A(B)(V)
				INCIDIN PLUS	amin	1%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	15 min	A(B)(V)
		1 x denně, dle potřeby	odstranit hrubé nečistoty. Plochy a povrchy předmětu ošetřit textilií smočenou v pracovním roztoku	CHLORAMIX DT	chlór	1 tbl./1,5 l	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	30 min	ABTM(V)
	epidemiologicky závažné situace-cílené potlačení TBC, vysoká organická zátěž. Velmi drsný povrch	při kontaminaci	předměty, které přicházejí do styku s potravinami, se musí po dezinfekci důkladně opláchnout	DESAM PRIM	chlór	2%	viz. návod na etiketě přípravku	viz. návod na etiketě přípravku	15min	AB(V)

Vysvětlivky:
A - Usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkovitých hub
B - Plná virucidní účinnost (Adenovirus, poliovirus)
(B) - Omezená virucidní účinnost (obalené viry)
C - Sporocidní účinnost
T - Tuberulocidní účinnost
M - Mykobaktericidní účinnost
(V) - omezená fungicidní účinnost (kvasinky)
V - Fungicidní účinnost

Pro úklid a dezinfekci používat vodu o teplotě 20 - 25 °C

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.