

Dietní systém Nemocnice Břeclav

základní diety

označení diety	název diety	charakteristika	složení diety				modifikace
			MJ	B (g)	T (g)	S (g)	
0	tekutá	krátkodobě po operacích v dutině ústní a na trávicím ústrojí	6	60	45	250	
1	kašovitá	šetřící úprava pokrmů	9,5	80	70	320	1K – kašovitá (snídaně viz. 1-S, přílohy pouze kaše)
2	šetřící	šetřící úprava pokrmů	9,5	80	70	320	2-K – šetřící, kožní 2-MM – šetřící, mleté maso
3	racionální	pro pacienty bez dietního omezení	9,5	80	70	320	3-1 – racionální, mletá 3/W – podává se pacientům, kteří užívají lék Warfarin na snížení krevní srážlivosti jako prevenci žilní embolie 3-MM – racionální, mleté maso 3/Blk – racionální, při intoleranci laktózy 3/W-MM – podává se pacientům, kteří užívají lék Warfarin na snížení krevní srážlivosti jako prevenci žilní embolie - mleté maso
4	s omezením tuku	šetřící úprava pokrmů	9,5	80	55	360	4-MM – s omezením tuků, mleté maso
5	s omezením nestavitelných zbytků	šetřící úprava pokrmů	9,5	80	70	320	
6	s omezením bílkovin	v základním provedení obsahuje 50 g B, množství B/den dle ordinace lékaře	9,5	50	70	350	
8	redukční	při obezitě, v případě dlouhodobé hospitalizace musí splňovat individuální potřebu daného pacienta	5,3	75	40	150	
9	diabetická	zastoupení živin podle typu zvolené diabetické diety	6,2 7,5 9 10,2	75 75 75 85	50 60 80 85	175 225 275 325	9-1 – diabetická, mletá 9-N – diabetická, neslaná 9/W – diabetická, podává se pacientům, kteří užívají lék Warfarin na snížení krevní srážlivosti jako prevenci žilní embolie 9/W - MM – diabetická, podává se pacientům, kteří užívají lék Warfarin na snížení krevní srážlivosti jako prevenci žilní embolie – mleté maso 9-MM – diabetická, mleté maso 9/Blk – diabetická, při intoleranci laktózy
10	neslaná	plnohodnotná, šetřící úprava pokrmů	9,5	80	70	320	
11	výživná	bez dietního omezení	12	105	80	420	
11P	racionální strava pro ženy po porodu	plnohodnotná, lehce stravitelná složením odpovídá nutričním potřebám žen po porodu	12	105	80	420	
SSB	strava batolat (1-3 roky)	plnohodnotná, lehce stravitelná složením odpovídá nutričním potřebám dětí	5,5	45	40	190	
SSK	kojenecká strava	příprava stravy – mléčná kuchyně nemocnice	složením odpovídá nutričním potřebám dětí				
12	strava menších dětí (4-6 let)	plnohodnotná, lehce stravitelná	7	60	55	230	12-T – strava menších dětí po TTO, TE

		složením odpovídá nutričním potřebám dětí					12/Blk – strava menších dětí při intoleranci laktózy
13	strava větších dětí (7-15 let)	plnohodnotná, lehce stravitelná složením odpovídá nutričním potřebám dětí	dětí 7-10 let				13/Blk – strava větších dětí, při intoleranci laktózy
			8,8	75	65	300	
			dětí 11 – 15 let				
			9,5	80	70	320	
14	výběrová, individuální jiné dietní předpisy dle rozpisu lékaře	individuální jídelní lístek, zajistit potřebnou nutriční hodnotu v optimální formě	složením odpovídá nutričním potřebám pacientů				14/ORL

speciální diety

0-S	čajová	podává se omezenou dobu při akutních stavech	neplnohodnotná strava				0-S-1 - čajová + přídavky
SPP-bujon	bujon	3x denně se podává bujón	neplnohodnotná strava				
Sonda	sonda		dle ordinace lékaře				sonda/9
1-S	tekutá výživná	pokud nemůže nemocný přijímat tuhou stravu (mixovaná strava)	9,5	80	70	320	1-S -T - strava menších dětí (4-6 let) – tekutá, výživná, mixovaná strava po TTO, TE, složením odpovídá nutričním potřebám dětí
9S	diabetická, šetřící	kombinace diabetické a šetřící diety, zastoupení živin podle typu zvolené diabetické diety	zastoupení jednotlivých živin viz. dieta číslo 9				9-S-1 – diabetická, šetřící, mletá 9-SN – diabetická, šetřící, neslaná 9-K – diabetická šetřící, kožní 9/50 - diabetická s omezením bílkovin 9-S-MM – diabetická, šetřící, mleté maso 9-S/Blk – diabetická, při intoleranci laktózy 9/1-S – diabetická tekutá výživná 9/0 – po bariatrických operacích
4S	s přísným omezením tuků	krátkodobé podání, po odeznění akutních obtíží	7	35	10	350	4S/9 – diabetická s přísným omezením tuků
KVM		vyšetřovací dieta na obsah kyseliny vanilmandlové	určuje se individuálně dle věku pacienta				
SPP-NK	nemastná kaše	krátkodobé podání, po odeznění akutních obtíží, po chirurgických operacích	neplnohodnotná strava				SPP-9/NK – diabetická nemastná kaše SPP-9 cukr
SPP-NT	nemastná tekutá strava	krátkodobé podání, po odeznění akutních obtíží, po chirurgických operacích	neplnohodnotná strava				
DNA	s omezením purinových látek		určuje se individuálně				
15/veg.	Vegetariánská strava		určuje se individuálně (nutričně se přibližuje fyziologickým principům správné výživy)				

standardizované dietní postupy

S/BLP1	bezlepková pro děti	pro pacienty s celiakií, složením odpovídá nutričním potřebám dětí	dle věku dítěte				
S/BLP2	bezlepková pro dospělé	pro pacienty s celiakií, vychází ze zásad zdravé výživy	9,5	80	70	320	
S/BLK	při intoleranci laktózy	pro pacienty s intolerancí laktózy	9,5	80	70	320	S/Blk-MM – při intoleranci laktózy, mleté maso
S/P II.	pankreatická	pro pacienty s akutní pankreatitidou, stádium II., podává se krátkou dobu, po odeznění akutních obtíží	-	20-40	0	100- 160	
S/P III.	pankreatická	pro pacienty s akutní pankreatitidou, stádium	-	50-60	20-30	250	

		III., podává se krátkou dobu, po odeznění akutních obtíží					
S/P III-9	diabetická, pankreatická	pro pacienty s akutní pankreatitidou, stádium III., podává se krátkou dobu, po odeznění akutních obtíží	-	50-60	20-30	225	
S/P IV.	pankreatická	pro pacienty s akutní pankreatitidou, stádium IV., podává se krátkou dobu, po odeznění akutních obtíží, postupně se přechází na d.č. 4	-	70-80	35-50	300	

Dodavatel je povinen přihlížet při tvorbě jídelníčku stravy pro pacienty k uvedeným modifikacím jednotlivých diet v Dietním systému nemocnice.