

DEZINFEKČNÍ ŘÁD NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.

Oblast použití		Způsob	Dezinfekční prostředek	Účinná látka	Koncentrace	Expoziční doba	Spektrum účinnosti
DEZINFEKCE RUKOU	hygienická (HDR) a chirurgická (CHDR) dezinfekce rukou	HDR: vtírat po dobu 30 s CHDR: vtírat po dobu 2x1,5 min	SKINMAN SOFT N	alkohol, KAS	koncentrát	30 s / 90 s	A(B)T(V)
			SKINMAN SOFT PROTECT	alkohol	koncentrát	30 s / 90 s	ABT(V)
DEZINFEKCE KŮŽE, SLIZNIC, celotělová dekolonizace MRSA	před vpichy, operační pole	otřít tamponem nebo postříkat	CUTASEPT F	alkohol, KAS	koncentrát	30 s	A(B)T(V)
			SKINSEPT G	alkohol, peroxid vodíku	koncentrát	1 až 10 min	A(B)T(V)
	celotělová dekolonizace pacientů osídlených MRSA	hygienické mytí těla i vlasů	SKINSAN SCRUB N	chlorhexidin, KAS	koncentrát	1 min	A(B)(V)
	dezinfekce sliznic	výplachy, oplachování, postříkem nebo tamponem	OCTENISEPT	octenidihydrochlorid	koncentrát	1 min	A(B)(V)
		výplachy, tamponem	SKINSEPT MUCOSA	chlorhexidin, alkohol, peroxid vodíku	koncentrát	1 min	A(B)(V)
VSTUPY i.v.	i.v. vstupy	otřít	ALCOHOL PADS	alkohol	čtverečky	1 min	ABT(V)
DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ	dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, sklo, plasty, předměty z pryže	zcela ponořit do připraveného roztoku, exponovat, opláchnout pitnou vodou, osušit, sterilizovat nebo ponořit do vyššího stupně dezinfekce	STABIMED FRESH	kokospropylendiamin	0,5%	30 min	A(B)T(V)
			SEKUSEPT AKTIV	kyselina peroxyoctová	2%	10 min	ABTMV
	čištění nástrojů a přístrojů	mechanická očista - provádí se buď ručně nebo pomocí mycích a čistících strojů, UZV	SEKU ZYME	enzym	0,5%	10 min	
VYŠŠÍ STUPEŇ DEZINFEKCE	pro zdravotnické prostředky, které nemohou být běžným způsobem sterilizovány	po dekontaminaci, mechanické očištění se ponoří do roztoku, po uplynutí expozice oplach sterilní vodou	SEKUSEPT AKTIV	kyselina peroxyoctová	2%	15 min (1 den)	ABCTMV
DEZINFEKCE A ČIŠTĚNÍ PLOCH, POVRCHŮ A PŘEDMĚTŮ	podlahy, plochy, nábytek, stoly, vozíky, předměty	mytí s dez. účinkem (kumulativní efekt) pracovním roztokem otřít plochy, povrchy do mokra a nechat zaschnout, 1x měsíčně prosterilovat dezinfekční prostředek za jiný s odlišnou aktivní látkou	INCIDIN PLUS	glukoprotamin	0,50%	30 min	A(B)TM(V)
			INCIDIN PRO	alkohol, amin, KAS	0,25%	30 min	A(B)(V)
	odstranění dezinfekčních vrstev	vždy při střídání aktivních látek	PROFLOOR UNI	tenzid	1%		
	epidemiologicky závažná situace	omýt pracovním roztokem	PROCURA PE	peroxid vodíku, kyselina peroctová	0,3%	30 min	ABCTMV
	vysoce epidemiologicky závažná situace - používání vždy jen na základě rozhodnutí nemocničního	omýt pracovním roztokem	PERFORM	monopersiran draselný, sodná sůl	1%	120 min	ABCTMV
DEZINFEKCE MALÉ PLOCHY	vyšetřovací a zákrové stoly, vozíky, instrument. stoly, lehátka, přístroje	nastříkat rozprašovačem, neotírat	INCIDIN LIQUID	alkohol	koncentrát	10 min	A(B)T(V)
		vlhkým ubrouskem důkladně otřít dezinfikovanou plochu	INCIDES N	alkohol	ubrousek	5 min	A(B)T(V)
VÝLEVKY	výlevky	1 tbl. do výlevky	MEDICARINE	dichlorizokyanurát sodný	1 tbl.	30 min	A(B)T(V)
STRAVOVACÍ PROVOZ	nádobí, přístroje, hrníčky, tácky	omýt připraveným roztokem	DESAM PRIM	chlornan sodný	2%	15 min	AB(V)

Platnost od 1.8.2017

Schválil:

PhDr. Jana Vacková, MBA v.r., hlavní sestra
Mgr. Tomáš Kůra v.r., nemocniční hygienik